


- HU** Alkalmazás előtt figyelmesen olvassa el használati útmutatót, akkor is, ha már használta korábban a Mycosan ecsetelő körömgomba kezelésére és megelőzésére készletet.
-  Előfordulhat, hogy a benne található információk az új kutatási eredmények alapján változtak a legutóbbi használat óta. Kérjük, hogy őrizze meg a tájékoztatót, későbbi tájékozódás céljából.

MYCOSAN



Klinikailag igazolt kezelés körömgombára

Felnőttek és 4 év feletti gyermekek részére. Cukorbetegnek is használhatják.

Mycosan ecsetelő készlet körömgombafertőzések kezelésére és megelőzésére:

- 5 ml-es kiszerelés - egy érintett köröm esetén
- 10 ml-es kiszerelés - több érintett köröm esetén

A Mycosan ecsetelő készlet kezeli és megelőzi a körömök gombásodását (fehér felületi onychomycosis [WSO] & distalis és laterális subungualis onychomycosis [DLSO]). A gombás köröm kezelésére a betegség terjedése, illetve súlyosbodásának megakadályozása miatt van szükség.

Miért érdemes a Mycosan körömgomba ecsetelő készletet használni?

- ✓ **Mycosan ecsetelő folyadék:** bizonyítottan hatásos körömgomba ellen, megállítja a körömgomba fejlődését
- ✓ **Precíziós ecset:** a nehezen hozzáférhető felületekhez való hozzáféréshez
- ✓ **10 db egyszer használatos körömrészelő:** a hatékonyság érdekében
- ✓ **Már 4 éves kortól alkalmazható,** cukorbetegnek is használhatják

A MYCOSAN ECSETELŐ KÖRÖMGOMBA KEZELÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE készlet tartalma:



1) PRECÍZIÓS ECSET:
A Mycosan ecsetelő folyadék célzott alkalmazásáért a nehezen elérhető felületekhez.



2) 10 DARAB EGYSZER HASZNÁLATOS RESZELŐ:
A kezelés sikerességéért.



3) KEZELÉSI ÜTEMTERV:
A hatékony kezelés támogatására.

A Mycosan ecsetelő folyadék hármassal bír:

1. Célzott hatása gyorsan megállítja a körömgombásodás kialakulásáért felelős organizmusok kifejlődését.
2. Behatol a körömbe, stabilizálja a köröm szerkezetét, védi és regenerálja a körmet.
3. Megelőzi a felületfertőződést. Védőréteget képezve, megakadályozza a gombás fertőzés további körmökre való áttérjedését. A Mycosan már az első kezeléstől kezdve hatásos. Színtelen és kevesebb, mint egy perc alatt szárad.

Összetevők:

Víz, fermentált rozszűrlet, pentilén-glikol, dimetil-izoszorbid, hidroxietil-cellulóz.

Az alkalmazás módja:

Használat előtt tisztítsa és szárítsa meg a körmet, a körömlakkot gondosan távolítsa el.

Mi a körömgombásodás?

A körömgombásodás (onychomycosis) a körmet megtámadó gombás fertőzés, mely a köröm fokozatos pusztulását okozza. Jellemző tünete a köröm megvastagodása, sárgás elszíneződése és a körömágytól való elválása. A körömgombás megbetegedés fájdalmas is lehet, különösen gyalogláskor. Kezelés nélkül a fertőzött terület állapota romlani fog, a körömgomba átterjedhet további körmökre is, sőt, másokat is megfertőzhet.

Mi okozhat körömgombásodást?

Több tényező segítheti elő a bőrgombásodás megjelenését: szintetikus anyagból készült zokni vagy szűk cipő viselése, egyes sportok űzése, pl. túrázás, maratoni futás. Általánosságban elmondható, hogy minden olyan helyzet, amely a láb izzadását és tartós befűlledését eredményezi, vagy jellege miatt az egyén könnyen kontaminálódhat, pl. úszás. Ilyenkor vagy új fertőződés, vagy korábban szerzett, nem megfelelően esetleg egyáltalán nem kezelt bőrgombás fertőzések újulhatnak ki.

Hogyan kezelheti?

A köröm gombás fertőzésének kezelése általában hosszú időt vesz igénybe. Az emberi köröm lassan nő, akár 6-9 hónapot is igénybe vehet, míg a károsodott rész teljesen lenő. Ezért fontos, hogy a fertőzés első jelére megkezdje a kezelést, valamint az, hogy folytassa a Mycosan használatát a jelen útmutatóban leírtak szerint. A körömgombásodás kezelésének első lépése a a körömgomba fejlődésének gátlása, majd az egészséges köröm növekedésének biztosítása. Ugyanakkor fontos, hogy csökkentsük a környező körömök fertőzésének kockázatát.

Aktív kezelés: fejezze be a kezelést a sikeres eredményért!

Ecsetelje be a köröm felszínét és szabad szélét Mycosannal naponta kétszer, négy héten keresztül. Hagyja megszáradni.

FIGYELEM! Óvatosan nyomja a tubust!

Ne felejtkezzen el lereszelni a körmeit!

Egy hét ecsetelést követően, hetente egyszer reszeljen le a beteg, megvastagodott körömreszből annyit, amennyit csak lehet. Használat után a reszelőt azonnal dobja ki!

Megelőző kezelés

Naponta egyszer használja a Mycosan körömgomba ecsetelőt a fertőzött köröm melletti körmökön is.

[FIG. 01]



1. Reszelés



2. Ecsetelés




3. Száradás

Ellenőrizze a kezelés hatását

A Mycosan hatásának megfigyeléséhez az alábbi ábrán jelölje be minden hónapban a gombával fertőzött terület nagyságát. Ezek az ábrák segítenek nyomon követni a gyógyulás folyamatát.

[FIG. 02]

Körömgombával fertőzött terület jelölése

Kezelés kezdete

1 hónap

2 hónap

3 hónap

Mycosan kezelési napló

- A sikeres kezelés érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban foglaltakat.
- Használja a lenti kezelési naplót a kezelések követésére.
- Még ha az első hónapban nem is túl látványos a javulás, ez nem jelenti azt, hogy a kezelés hatástalan lenne. Az emberi köröm lassan nő, és akár 6-9 hónapot is igénybe vehet, míg a károsodott rész teljesen lenő. Kezelje rendszeresen a körmét, és kövesse nyomon a kezelést az ábrákon.

[FIG. 03]

Kezelési ütemterv

Kezelés kezdetének dátuma: _____

Hét	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Reszelés	
1	1	2	1	2	1	2	1	2	0
2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
3	1	2	1	2	1	2	1	2	1
4	1	2	1	2	1	2	1	2	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1	1
...									1

Megjegyzés. jelöljön a naplóban (X)-el minden egyes elvégzett kezelést (ecseteléseket vagy reszeléseket).**Lehetséges mellékhatások**

Ritka esetben előfordulhat a készítmény valamelyik összetevőjével szembeni allergiás reakció (kontakt dermatitis). Ha bőrirritáció vagy kiütés jelentkezik, azonnal szüntesse be a kezelést. Ha a probléma tartósan fennáll, kérje orvosa tanácsát.

Figyelmeztetések a használati kapcsolatban:

- Csak külsőleges használatra.
- Terhesség alatt a terméket kizárólag kezelőorvosával való egyeztetést követően és annak felügyelete mellett alkalmazza. A termék szoptatási időszak alatt is használható.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- A Mycosan bármilyen összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén, ne használja a készítményt.
- A fertőzés terjedésének elkerülése miatt, egy csomagolási egységet csak egy személy használjon.
- **Óvatosan nyomja meg a tubust és használat után gondosan zárja le.**

További javaslatok a Mycosan-kezelés hatásosságának elősegítésére

- Kéz- és lábmosás után gondosan törölje szárazra bőrét. Különösen figyeljen arra, hogy az ujjközöket is szárazra törölje.
- Vágja rövidre a körmeit, és kerülje a körömrágást.
- Viseljen pamutból készült zoknit, amely szárazon tartja a lábát. Lábizzadás esetén cseréljen gyakrabban zoknit.
- Rendszeresen cseréljen cipőt és hagyja cipőjét kiszellőzni és kiszáradni a két használat között. Kerülje a szintetikus anyagokból készült cipők viselését.
- Cipője se túl bő, se túl szűk ne legyen, tegye lehetővé a láb szellőzését.
- Többek által használt nedves környezetben (uszoda, öltöző, szauna stb.) mindig viseljen papucsot.
- Kezelje bőrének gombás fertőzését gombaellenes szerrel. Bőrgombásodás esetén javasolt külön törölköző használata, valamint a cipő és zokni gombaellenes szerrel történő kezelése.

A Mycosan termékcsalád olyan készítményeket kínál, amelyek egyszerűen, higiénikusan és hatékonyan segítenek a bőrgombásodás és körömgombásodás megelőzésében és kezelésében.

**MYCOSAN ECSETELŐ KÖRÖMGOMBA KEZELÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE KÉSZLET**

- Látható eredmény 2 héten belül
- Mycosan precíziós ecset
- 10 darab egyszer használatos körömrészelőt tartalmaz

**MYCOSAN ECSETELŐ BŐRGOMBA KEZELÉSÉRE**

- Azonnal enyhíti a viszketést
- Elpusztítja a gombák 99,9% -át *
- Precíziós ecset: higiénikus és célzott használatra

* Elpusztítja a bőrgombást okozó gombák 99,9% -át

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A WWW.MYCOSAN.HU OLDALON**Felhasználhatósági idő és tárolás**

Tárolja szobahőmérsékleten.

Gyermekek elől elzárva tartandó.



A Mycosan felbontás után legfeljebb egy évig használható, de maximum a csomagoláson jelölt lejárati ideig.

**Gyártó:**Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Hollandia**Forgalmazó:**Supremex Kft.
1138 Budapest, Bodor u.1. l. em. 8.
Magyarország
info@supremex.hu
+36 1 621 2979**Gyártási szám és lejárati idő: a dobozon és tubuson**

Ne szennyezze környezetét, a fel nem használt terméket illetve csomagolását vigye vissza a gyógyszerháza!

**Orvostechnikai eszköz**MYCOSAN ECSETELŐ KÖRÖMGOMBA KEZELÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE KÉSZLET.
I. típusú orvostechnikai eszköz