

HU Gondosan olvassa el a használati utasítást a Mycosan ecsetelő körömgomba kezelésére készlet használatára. **ELŐFORDULHAT, HOGY AZ INFORMÁCIÓKAT A TERMÉK LEGUTÓBBI HASZNÁLATA ÓTA ÚJ KUTATÁSOK ÉS EREDMÉNYEK ALAPJÁN MÓDOSÍTOTTÁK. ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTUTATÓT KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.**

MYCOSAN  **Köröm**

Klinikailag igazolt kezelés körömgombára

Felnőttek és 4 év feletti gyermekek részére. Cukorbetegség is használható.



CUKORBETEGEK IS
HASZNÁLHATJÁK

Mycosan ecsetelő körömgomba fertőzések kezelésére készlet:

5 ml-es kiszerezés - egy érintett köröm esetén / 10 ml-es kiszerezés - több érintett köröm esetén

Használati utasítás

A Mycosan ecsetelő készlet kezeli és megakadályozza a körmök és ujjak gombásodását (*Ifehér felületi onychomycosis (WSO) & distalis és laterális subungualis onychomycosis (DLSO)*), amelyeket olyan gombák okoznak, mint a *T. rubrum*, a *T. mentagrophytes* és az *E. floccosum*. Az onychomikózis a körmök gombás fertőzése, amely elszíneződést, megvastagodást és a körömágytól való elválást okoz. A gombás köröm kezelésére, a betegség terjedése, illetve súlyosbodásának megakadályozása miatt van szükség.

Használat célja

A Mycosan körömgomba ecsetelő készlet célja, hogy filmréteget képezzen a körömen, amely meggátolja a gombás fertőzésben szerepet játszó gombák szaporodását savasodás útján.

Miért érdemes a Mycosan körömgomba ecsetelő készletet használni?

- ✓ **Mycosan ecsetelő folyadék:** bizonyítottan hatásos körömgomba ellen, megállítja a körömgomba fejlődését
- ✓ **Precíziós ecset:** a nehezen hozzáférhető felületekhez való hozzáféréshez
- ✓ **10 db egyszer használatos körömrészelő:** a hatékonyság érdekében
- ✓ **Már 4 éves kortól alkalmazható,** cukorbetegség is használható.

A Mycosan körömgomba ecsetelő készlet tartalma:



1) PRECÍZIÓS ECSET

A Mycosan ecset célzott alkalmazásáért a nehezen elérhető felületekhez.



2) 10 DARAB EGYSZER HASZNÁLATOS RESZELŐ

A kezelés sikerességéért.



3) KEZELÉSI ÜTEMTERV

A hatékony kezelés támogatására.

A Mycosan ecsetelő folyadék hármas hatással bír:

1. Hatékony

Célzott hatása gyorsan megállítja a körömgomba kialakulásáért felelős organizmusok kifejlődését.

2. Regenerálja a körömöt

Behatol a körömbé, stabilizálja a köröm szerkezetét, védi és regenerálja a körömöt.

3. Javítja a köröm kinézetét

Segít a köröm elszíneződésének megállításában

Összetevők

Víz, fermentált rozsszűrlet, pentilén-glikol, dimetil-izoszorbid (1.5%), hidroxietil-cellulóz (0.7%).

Az alkalmazás módja

Használat előtt tisztítsa és szárítsa meg a körömöt, a körömlakkot gondosan távolítsa el.

Reszelje le a körömöt, alkalmazza a Mycosan ecsetelő készletet és hagyja megszáradni. **[FIG. 01]**

[FIG. 01]

Lépésről lépésre a Mycosan gombás körömkezelés használatára



1. Reszelés



2. Ecsetelés



3. Száradás

Mi a körömgomba?

A körömgomba (onychomycosis) a köröm megtámadó gombás fertőzés, mely a köröm fokozatos pusztulását okozza. Jellemző tünete a köröm megvastagodása, sárgás elszíneződése és a körömágytól való elválása. A körömgombás megbetegedés fájdalmas is lehet, különösen gyalogláskor. Kezelés nélkül a fertőzött terület állapota valószínűleg romlani fog, a körömgomba átterjedhet további körmökre is, sőt, másokat is megfertőzhet.

Mi okozhat körömgombát?

Több tényező járulhat hozzá a körömgomba megjelenéséhez: kisebb sérülések, szintetikus anyagból készült zokni viselése, szűk cipő viselése, egyes sportok üzése, úgy, mint úszás, túrázás, maratoni futás. Általánosságban a láb izzadását és tartós befülledését eredményező helyzetek. A körömgombát a köröm gombás fertőzése okozza, melyet egy előzőleg kialakult fertőzés, pl. lábomba hív életre. Valójában a hiányosan, vagy egyáltalán nem kezelt bőrgombás fertőzések terjednek tovább, és okozzák a körömgombát. Cukorbetegség, keringési problémáktól szenvedők, zárt, könnyen befülledő cipő (pl. biztonsági cipő) tartós viselésére kényszerülők, stb. hajlamosabbak a gombás fertőzésekre. Ha a probléma tartósan fennáll, kérje orvosát vagy gyógyszerészét tanácsát.

Hogyan kezelheti?

A köröm gombás fertőzésének kezelése az esetek többségében hosszú időt vesz igénybe. Az emberi köröm lassan nő, akár 6-9 hónapot is igénybe vehet, míg a károsodott rész teljesen lenő. Ezért fontos, hogy a fertőzés első jelére megkezdje a kezelést, valamint az, hogy folytassa a Mycosan használatát a jelen útmutatóban leírtak szerint. A körömgomba kezelése először az érintett köröm kialakulásának gátlását jelenti, majd később az egészséges köröm növekedésének biztosítását. Ugyanakkor fontos, hogy csökkentse a környező körmök fertőzésének kockázatát.

Aktív kezelés: fejezze be a kezelést a sikeres eredményért!

Vigyen egy kis csepp szérumot naponta kétszer négy héten keresztül az érintett körömre és a köröm hegyére. Egy kis csepp elegendő. Hagyja egy percig száradni. Ezt követően napi egy kezelés elegendő, míg a köröm vissza nem nyeri szokásos állapotát.

Figyelem! Óvatosan nyomja a tubust!


A reszelés fontos!

Egy hetes kezelést követően, hetente egyszer reszeljen le a beteg, megvastagodott körömrészből annyit, amennyit csak lehet.

Figyelem! A mellékelt reszelők mindegyikét csak egy alkalommal használja, a fertőzés továbbterjedésének elkerülése érdekében.

Sablon az előrehaladás nyomon követésére

Azért, hogy a köröm állapotának javulását nyomon követhesse jelölje ceruzával a gombával érintett területet havonta az alábbi ábrán. Ez segít mérni az elért eredményt. [FIG. 02 - köröm sablon]



Mycosan kezelési napló

- A sikeres kezelés érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban foglaltakat.
- Használja a lenti kezelési naplót a kezelések követésére.
- Még ha az első hónapban nem is túl látványos a javulás, ez nem jelenti azt, hogy a kezelés hatástalan lenne. Az emberi köröm lassan nő, és akár 6-9 hónapot is igénybe vehet, míg a károsodott rész teljesen lenő. Kezelje rendszeresen a körmét, és kövesse nyomon a kezelést az ábrákon.

[FIG. 03 – kezelési ütemterv]

[FIG. 03] Kezelés kezdetének dátuma: _____

Hét	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Reszelés
1	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	0
2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1
3	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1
4	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1
5	1	1	1	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1	1	1	1
...								1

Megjegyzés. Jelöljön a naplóban (X)-el minden egyes elvégzett kezelést (ecseteléseket vagy reszeléseket).

Lehetséges mellékhatások

Ritka esetben előfordulhat a készítmény valamelyik összetevőjével szembeni allergiás reakció (kontakt dermatitis).

Ha bőrirritáció vagy kiütés jelentkezik, azonnal szüntesse be a kezelést. Ha a probléma tartósan fennáll, kérje orvosa tanácsát.

Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban:

- Csak külsőleges használatra.
- Terhesség alatt a terméket kizárólag kezelőorvosával való egyeztetést követően és annak felügyelete mellett alkalmazza. A termék szoptatási időszak alatt használható.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.
- A Mycosan bármilyen összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén, ne használja a készítményt.
- A Mycosan csak egy személy kezelésére használható, így elkerülhető mások megfertőzése.
- Óvatosan nyomja és használat után gondosan zárja le a tubust.

További javaslatok a Mycosan-kezelés hatásosságának elősegítésére

- Kéz- és lábmosás után gondosan törölje szárazra bőrét. Különösen figyeljen arra, hogy az ujjközket is szárazra törölje.
- Vágja rövidre a körmeit, és kerülje a körömrágást.
- Viseljen pamutból készült zoknit, amely szárazon tartja a lábát. Lábizzadás esetén cseréljen gyakrabban zoknit.
- Rendszeresen cseréljen cipőt és hagyja cipőjét kiszellőzni és kiszáradni a két használat között. Kerülje a szintetikus anyagokból készült cipők viselését.
- Cipője se túl bő, se túl szűk ne legyen, tegye lehetővé a láb szellőzését.
- Többek által használt nedves környezetben (uszoda, öltöző, szauna stb.) mindig viseljen papucsot.
- Kezelje bőrének gombás fertőzését [pl. lábgombáját] gombaellenes szerrel. Láb gomba esetén javasolt külön törölköző használata, valamint a cipő és zokni gombaellenes szerrel történő kezelése.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A WWW.MYCOSAN.HU OLDALON.



Felhasználhatósági idő és tárolás

Tárolja szobahőmérsékleten.
Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ne tárolja tűző napon.

Gyártó:
Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Hollandia

Forgalmazó
Supremex Kft.
1138 Budapest, Bodor u.1. l. em.8.
Magyarország
info@supremex.hu
+36 1 621 2979



Gyártási szám és lejárat: a dobozon és tubuson

A kezelés befejezése után dobja el a tubust, a használati utasítást és a kartondobozt, mint minden kommunális hulladék esetében. Védje környezetét, hasznosítsa újra.



Egy beteg, többszöri felhasználás



MD Orvostechnikai eszköz

M034HU102

A használati utasítás utoljára frissítve: 2024. május